

09 Zampullín cuellinegro



SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en octubre. Muda **postjuvenil** parcial, cambiando las plumas del cuerpo y cola; algunos ejemplares pueden retrasarla hasta diciembre. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** donde cambian las plumas de la cola y cuerpo adquiriendo el plumaje de cortejo.

ZAMPULLÍN CUELLINEGRO (*Podiceps nigricollis*)

IDENTIFICACIÓN

28-34 cm. En plumaje **nupcial** con dorso, cabeza y cuello negros, con plumas doradas detrás de los ojos; flancos castaños; abdomen blanco. En plumaje **no nupcial** partes superiores oscuras; partes inferiores blanquecinas; cabeza negra sólo hasta los ojos.

ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie en Aragón.

EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

Juveniles con partes superiores de color marrón claro; escapulares generalmente con restos de plumón en la punta.

1º invierno con aspecto similar al **adulto** pero partes superiores con plumas marrones **juveniles** mezcladas con las oscuras propias del **adulto**; al final del invierno todas las plumas marrones **juveniles** se han perdido pero están retenidas las coberteras del ala y escapulares.

2º año primavera con aspecto similar al **adulto**, pero con las plumas del capirote con un color negro más apagado y con algunas plumas marrones; coberteras del ala y primarias erosionadas y decoloradas por el desgaste.

Adulto en invierno con partes superiores negro uniforme: escapulares con puntas redondeadas y bien formadas; en **primavera** con las plumas del capirote negro brillante y sin plumas marrones mezcladas; coberteras del ala y primarias con puntas poco desgastadas.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año si bien en número muy pequeño. Es principalmente una especie reproductora con algunos ejemplares invernantes.