

# 129 Águila pescadora



## ÁGUILA PESCADORA (*Pandion haliaetus*)

### IDENTIFICACIÓN

60-71 cm. Cabeza blanca, con una banda negra en los lados; partes superiores pardo oscuro; partes inferiores blancas, con banda pectoral parda; alas oscuras por encima y claras por abajo, con una mancha oscura; primarias con punta negra.

### ESPECIES SIMILARES

Recuerda una **Culebrera europea**, que carece de mancha carpal oscura en la parte inferior del ala y de la banda negra sobre los ojos.



Culebrera europea

### SEXO

**Macho** habitualmente con una banda pectoral fina o sin banda; pequeñas y medianas infracoberteras del ala de color blanco. **Hembra** con banda pectoral ancha, oscura y bien marcada; pequeñas y medianas infracoberteras del ala con puntos oscuros. (**CAUTION:** sexar esta especie no es siempre posible debido al solapamiento y se dan excepciones a los caracteres indicados). El tamaño puede ser un carácter útil: **macho** con ala menor de 470 mm; **hembra** con ala mayor de 500 mm.

### EDAD

Las aves de **2º año** permanecen en sus lugares de invernada y no viajan a Europa, por lo que sólo pueden reconocerse 2 tipos de edad:

**Juvenil** con partes superiores con moteado ante; capirote estriado; grandes coberteras con punta clara; plumas de vuelo con punta clara; secundarias barreadas y sin banda oscura subterminal; grandes infracoberteras del ala formando una banda poco marcada; partes inferiores teñidas de ante; plumas de vuelo de una sola generación.

**Adultos** con partes superiores sin moteado ante, de color marrón oscuro uniforme; capirote blanco, con frente más oscura; grandes coberteras sin punta clara; plumas de vuelo sin punta clara; secundarias con banda oscura subterminal; grandes infracoberteras del ala formando una banda muy bien marcada; partes inferiores blancas; plumas de vuelo de varias generaciones.

### MUDA

La muda comienza en el **2º año** y es prácticamente continua, interrumpiéndose solo durante los periodos migratorios.

### FENOLOGÍA

|   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |

### ESTATUS EN ARAGÓN

Presente en paso, principalmente en el Ebro y los grandes embalses de la Comunidad; existen algunas citas de aves en verano.