

# 148 Polluela pintoja



## POLLUELA PINTOJA (*Porzana porzana*)

### IDENTIFICACIÓN

21-23 cm. Cabeza parda rayada de negro, con banda gris a los lados; dorso y coberteras del ala pardo oscuro, con bordes oliva y estrías blancas; pecho con pintas blancas; partes inferiores gris con tinte oliva; flanco barredo con rayas pardas, negras y blancas; pico verde amarillento con base roja; patas verde oliva.

### ESPECIES SIMILARES

El **rascón europeo** tiene un pico largo y rojizo. La **polluela bastarda** carece de moteado blanco en la cabeza, pecho y nuca. La **polluela chica** no tiene moteado blanco en la cabeza ni macha roja en la base del pico.



Rascón europeo

### SEXO

En **primavera, macho** con mejillas y lados de la garganta gris pizarra puro, con sólo un área reducida de moteado blanco rodeando la zona auricular; habitualmente con moteado en el pecho pequeño. **Hembra** con mejillas y lados de la garganta gris pizarra apagado, con sólo un área amplia de intenso moteado blanco rodeando la zona auricular; habitualmente con moteado en el pecho grande, tendiendo al barredo (**CUIDADO:** la intensidad y forma del moteado del pecho puede ser muy variable en ambos sexos).

En **otoño, macho** con mejillas y lados de la garganta fuertemente moteados de blanco; estría junto al ojo gris, con algo de moteado blanco principalmente al final de la cabeza. **Hembra** similar al **macho**, pero con mejillas y lados de la garganta más fuertemente moteados de blanco, con gris puro sólo en la parte frontal de la estría junto al ojo en el centro de la garganta.

Los **juveniles** no pueden sexarse utilizando el diseño del plumaje.

### EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juveniles** con ceja marrón moteada de blanco; pecho marrón con moteado blanco; sin gris en la cabeza y pecho; iris de color oliva o verde intenso; pico oscuro con amarillo en la base.

**2º año** similar al **adulto**, pero puede retener plumas claras **juveniles** en el mentón y garganta; en **primavera** con plumas de vuelo **juveniles**.

**Adultos** con el plumaje descrito en **SEXO**; iris de amarillo marrón a rojo marrón; pico amarillento tirando a verde oliva en la punta, con base naranja o roja.

### MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en octubre. La muda **postjuvenil** es parcial, cambiando únicamente las plumas del cuerpo; suele estar terminada en octubre. Existe una muda **prenupcial** que abarca sólo plumas corporales.

### FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

## 148 Polluela pintoja



### ESTATUS EN ARAGÓN

Estatus poco conocido. Existe la posibilidad de su reproducción en Aragón, siendo más frecuente en los pasos.