

169 Chorlitejo grande



Chorlitejo grande. Otoño. Juvenil (11-IX).

CHORLITEJO GRANDE (*Charadrius hiaticula*)

IDENTIFICACIÓN

18-19 cm. Partes superiores pardas; partes inferiores blancas; banda pectoral negra, más estrecha en los hombros; barra frontal y antifaz negros; alas pardas con una banda blanca; patas anaranjadas; pico amarillo en la base. **Juveniles** más pardos, sin negro en la cabeza y con el collar incompleto y pardo.

ESPECIES SIMILARES

El **chorlitejo chico** es parecido, pero tiene amarillo en las patas, base del pico oscura y tiene blanco en el capirote; el **chorlitejo patinegro** tiene patas oscuras y carece de barra frontal negra. El juvenil de **chorlitejo chico** carece de ceja blanca y el de **chorlitejo patinegro** tiene el collar reducido a una mancha en el pecho.



Chorlitejo chico. Adulto



Chorlitejo chico. Juvenil



SEXO

En plumaje **nupcial, macho** con la banda del pecho totalmente negra o con sólo muy pocas plumas marrones en los lados; anillo ocular anaranjado. **Hembra** con la banda negra del pecho con un número considerable de plumas marrones; anillo ocular gris apagado o ligeramente amarillento. En **otoño**, un elevado porcentaje de aves puede ser sexado atendiendo al diseño del pecho, si bien hay ejemplares intermedios que son inseparables. Los **juveniles** no se pueden sexar atendiendo al diseño del plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con la banda del pecho marrón, a menudo incompleta; marcas de la cabeza marrón oscuro; plumas del dorso y coberteras alares con bordes ante pálido; pico oscuro; patas amarillo-naranja apagado; plumas de vuelo sin rastro de muda.

2º año primavera con aspecto similar al **adulto** pero pueden retener algunas coberteras alares **juveniles**; primarias moderadamente desgastadas.

Adultos con las bandas del pecho y cabeza negras; coberteras del ala gris marrón con delgados bordes blancuzcos; con muda activa de las plumas de vuelo en **otoño**.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que generalmente suele comenzar a partir de junio y terminar en las zonas de invernada. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo todas o la mayor parte de las plumas del cuerpo, algunas medianas y pequeñas coberteras alares internas y ocasionalmente terciarias y cola, dejando sin cambiar las secundarias y primarias; comienza a partir de agosto y termina en las áreas de invernada. En ambos tipos de edad la muda **prenupcial** es prácticamente inapreciable.


FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII



ESTATUS EN ARAGÓN

Presente en migración con rarísimas citas de reproducción. Puede encontrarse en cualquier zona húmeda con aguas someras de la Comunidad.

169 Chorlitejo grande




Chorlitejo grande. Otoño. Adulto. Macho ().




Chorlitejo grande. Otoño. Diseño del capirote: arriba izquierda adulto macho (); arriba derecha adulto hembra (); izquierda juvenil (11-IX).

Chorlitejo grande. Otoño. Adulto. Hembra ().




Chorlitejo grande. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto macho (); centro adulto hembra (); abajo juvenil (11-IX).



Chorlitejo grande. Otoño. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto macho (); arriba derecha adulto hembra (); izquierda juvenil (11-IX).





169 Chorlitejo grande




Chorlitejo grande. Otoño. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto macho (); arriba derecha adulto hembra (); izquierda juvenil (11-IX).



Chorlitejo grande. Otoño. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto macho (); arriba derecha adulto hembra (); izquierda juvenil (11-IX).




Chorlitejo grande. Otoño. Diseño de las patas: arriba adulto macho (); centro adulto hembra (); abajo juvenil (11-IX).




Chorlitejo grande. Otoño. Diseño de terciarias: arriba izquierda adulto macho (); arriba derecha adulto hembra (); izquierda juvenil (11-IX).


169 Chorlitejo grande



Chorlitejo grande. Otoño. Adulto. Macho: diseño de primarias ().



Chorlitejo grande. Otoño. Adulto. Hembra: diseño de secundarias ().





Chorlitejo grande. Otoño. Adulto. Hembra: diseño de primarias ().




Chorlitejo grande. Otoño. Juvenil: diseño de secundarias (11-IX).



Chorlitejo grande. Otoño. Juvenil: diseño de primarias (11-IX).





Chorlitejo grande. Otoño. Adulto. Macho: diseño del ala ().



Chorlitejo grande. Otoño. Adulto. Macho: diseño de secundarias ().

169 Chorlitejo grande



Chorlitejo grande. Otoño. Adulto. Hembra: diseño del ala ().



Chorlitejo grande. Otoño. Juvenil: diseño del ala (11-IX).