

172 Chorlitejo patinegro



CHORLITEJO PATINEGRO (*Charadrius alexandrinus*)

IDENTIFICACIÓN

15-16 cm. Partes superiores pardo-gris; partes inferiores blancas; banda pectoral interrumpida, lateral, negra en el **macho**, parda en la **hembra**; capirote pardo-rojizo, bordeado de negro en el **macho**; alas pardas con franja alar blanca; pico y patas oscuras. **Juveniles** más pardos, sin negro en la cabeza y con partes su-

ESPECIES SIMILARES

Los **chorlitejos grande** y **chico** tienen la banda del pecho cerrada.



Chorlitejo chico.
Adulto

Chorlitejo chico.
Juvenil



SEXO

En plumaje **nupcial** el **macho** tiene negro en la frente, lista sobre el ojo y collar; capirote rojizo. La **hembra** carece de negro en la frente, lista sobre el ojo y collar (algunos ejemplares con plumas oscuras sueltas); capirote pardo. En **otoño** ambos sexos son inseparables hasta que el **macho** comienza a tener plumas oscuras a partir de primeros de **invierno**. Los **juveniles** no se pueden sexar.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con las plumas del dorso y coberturas alares de color gris con amplios bordes ante; manchas del pecho marrones, frecuentemente indistinguibles.

1º año otoño/2º año primavera como el **adulto**, pero pueden retener algunas plumas juveniles en la espalda, obispillo y coberturas alares. En **primavera**, los ejemplares de **2º año** se reconocen por tener mayor desgaste en primarias que los **adultos**.

Adultos en **primavera** con marcas en pecho y cabeza negro o marrón; coberturas gris marrón, con borde pálido; en **invierno** primarias ligeramente gastadas.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele comenzar a partir de junio y terminar en octubre. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo las plumas del cuerpo (algunos ejemplares retienen algunas en el dorso), cola y coberturas alares (retienen la mayor parte de las grandes coberturas), dejando sin cambiar las plumas de vuelo; comienza a partir de agosto y termina en las áreas de invernada. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial**, entre enero y abril, que incluye casi todas las plumas del cuerpo, parte de las coberturas alares, escapulares y la cola sólo en algunos ejemplares.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival, si bien es posible encontrar algunos ejemplares en invierno. Nidifica en algunas hipersalinas como Gallocanta, Chiprana, Estaña y saladas de Monegros.

172 Chorlitejo patinegro

