

187 Correlimos zarapitín



CORRELIMOS ZARAPITÍN (*Calidris ferruginea*)

IDENTIFICACIÓN

18-19 cm. En plumaje **nupcial** con dorso pardo oscuro y partes inferiores rojizas; en **invierno** con dorso gris y vientre blanco; cabeza con ceja clara; ala con una banda blanca; pico largo y curvado; patas oscuras.

ESPECIES SIMILARES

En plumaje **nupcial** inconfundible debido al color rojizo de la cabeza y partes inferiores. En plumaje **no nupcial** recuerda un **correlimos común**, que tiene el pico más corto y una línea parda en el obispillo.



Correlimos común

SEXO

En plumaje **nupcial**, **macho** con el color castaño más intenso, menos plumas blancas y barras marrones menos marcadas que en las **hembras**. En plumaje **no nupcial** el diseño de ambos sexos es similar. La longitud del pico puede ser útil en casos extremos: **hembra** con pico más largo de 40 mm; **macho** con pico más corto de 36 mm.

EDAD

Desde que habitualmente las aves de **2º año** permanecen en sus zonas de invernada, en Aragón sólo pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juveniles con partes superiores marrón oscuro con bordes ante claro y castaño; coberteras del ala marrones con anchos bordes ante claro; partes inferiores blancas manchadas de ante; pecho ligeramente estriado de marrón.

Adultos en **plumaje nupcial (primavera)** con partes superiores marrón oscuro con bordes blancuzcos o grises; coberteras del ala gris-marrón, las externas con punta gris y las internas con borde blanco; partes inferiores castañas, con barras oscuras y puntas blancuzcas. En **otoño**, después de la muda **postnupcial** con partes superiores grises; coberteras del ala grises, con bordes blancos; partes inferiores blancas; pecho claro con ligero estriado gris marrón.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, comenzando con las plumas corporales en las zonas de cría, suspendiéndose para la migración y terminada en las zonas de invernada. La muda **postjuvenil** es parcial y similar al **adulto**, si bien generalmente no comienza, o es muy escasa, antes de llegar a los cuarteles de invierno; pueden dejar retenidas plumas de vuelo. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** parcial, entre febrero y abril, que incluye plumas corporales, plumas centrales de la cola, alguna terciaria y a veces coberteras del ala.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Presente sólo en migración en cualquier zona húmeda de la Comunidad.