

209 Andarríos bastardo



Andarríos bastardo. Otoño. Adulto (29-VII).

ANDARRÍOS BASTARDO (*Tringa glareola*)

IDENTIFICACIÓN

19-20 cm. Partes superiores pardo verdosas, con moteado blancuzco; ceja conspicua; partes inferiores blancas, con pecho rayado; alas oscuras sin banda blanca; infracoberteras del ala claras; obispillo blanco; cola blanca, finamente barreada; pico oscuro; patas verdosas.

ESPECIES SIMILARES

Recuerda a un **andarríos chico**, que es de menor tamaño, sin obispillo blanco y con línea blanca en el ala. El **andarríos grande** es muy parecido pero carece de ceja clara y tiene las infracoberteras del ala oscuras.



Andarríos chico



Andarríos grande

SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con plumas del dorso y coberteras del ala marrón oscuro con profuso moteado ante; medianas coberteras del ala con oblicuo moteado claro a los lados de la pluma.

2º año primavera reconocibles por mantener las plumas de vuelo juveniles.

Adultos con las plumas del dorso y coberteras del ala marrón oscuro, con difuso moteado blancuzco; medianas coberteras del ala con centro gris y moteado blanco triangular a los lados de la pluma.

MUDA


Muda **postnupcial** completa, comenzando generalmente en las áreas de cría y terminada en sus zonas de invernada (**CUIDADO:** algunos ejemplares la comienzan en sus cuarteles de invierno). La muda **postjuvenil** es parcial cambiando las plumas corporales, terciarias, plumas centrales de la cola y algunas coberteras y plumas de vuelo; raramente comienza antes de llegar a las áreas de invernada. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial**, entre febrero y abril, que incluye plumas corporales, algunas terciarias y coberteras del ala.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie en paso, migrando habitualmente en grupos grandes. Puede encontrarse en cualquier zona húmeda de la Comunidad.



Andarríos bastardo. Diseño del obispillo, cola, ala e infracoberteras alares.

209 Andarríos bastardo



Andarríos bastardo. Otoño. Juvenil (26-VIII).



Andarríos bastardo. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (29-VII); derecha juvenil (26-VIII).



Andarríos bastardo. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto (29-VII); abajo juvenil (26-VIII).




Andarríos bastardo. Otoño. Diseño del pecho: arriba adulto (29-VII); abajo juvenil (26-VIII).



Andarríos bastardo. Otoño. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto no mudado (29-VII); arriba derecha adulto en muda activa (18-VIII); izquierda juvenil (26-VIII).

209 Andarríos bastardo



Andarríos bastardo. Otoño. Adulto en muda activa: diseño de coberteras del ala (18-VIII)



Andarríos bastardo. Otoño. Diseño de terciarias y escapulares: arriba izquierda adulto no mudado (29-VII); arriba derecha adulto en muda activa (18-VIII); izquierda juvenil (26-VIII).



Andarríos bastardo. Otoño. Juvenil: diseño de coberteras del ala (26-VIII)



Andarríos bastardo. Otoño. Adulto no mudado: diseño de coberteras del ala (29-VII)



Andarríos bastardo. Otoño. Adulto no mudado: diseño de primarias (29-VII)

209 Andarríos bastardo



Andarríos bastardo. Otoño. Adulto en muda activa: diseño de primarias (18-VIII)



Andarríos bastardo. Otoño. Adulto en muda activa: diseño de secundarias (18-VIII)



Andarríos bastardo. Otoño. Juvenil: diseño de primarias (26-VIII)



Andarríos bastardo. Otoño. Juvenil: diseño de secundarias (26-VIII)



Andarríos bastardo. Otoño. Adulto no mudado: diseño de secundarias (29-VII)



Andarríos bastardo. Otoño. Adulto no mudado: diseño del ala (29-VII)

209 Andarríos bastardo



Andarríos bastardo. Otoño. Adulto en muda activa: diseño del ala (18-VIII)



Andarríos bastardo. Otoño. Juvenil: diseño del ala (26-VIII)