

**249 Fumarel cariblanco****FUMAREL CARIBLANCO** (*Chlidonias hybridus*)**IDENTIFICACIÓN**

23-24 cm. En primavera, con mejillas blancas; capirote negro; plumas del cuerpo grises; pico y patas rojos. En invierno, plumaje blanco con partes superiores grises; auriculares negras; capirote manchado de negro.

**ESPECIES SIMILARES**

En **plumaje nupcial** es inconfundible debido a su capirote y nuca negros y color gris azulado del plumaje. En plumaje **no nupcial** recuerda un **fumarel común**, que tiene tinte oscuro en las pequeñas coberteras del ala y en las primarias externas. El **juvenil** de **fumarel común** tiene las plumas del dorso con borde gris.

**SEXO**

Sexos con plumaje similar, si bien las partes inferiores de la **hembra** a veces ligeramente más claras que en el **macho**.

**EDAD**

Pueden reconocerse hasta 3 tipos de edad:

**Juvenil** sin collar claro en la parte posterior del cuello; las plumas gris claro del manto, escapulares y coberteras internas del ala con barras subterminales negras y sepia.

**2º año** similar al **adulto** e indistinguible después de haber perdido las últimas plumas **juveniles**; sólo un pequeño número de ejemplares pueden reconocerse por mantener en primavera el plumaje **no reproductor**.

**Adulto** en **primavera** con capirote y parte posterior del cuello negro; en **otoño** con collar claro en la parte posterior del cuello; las plumas gris claro del manto, escapulares y coberteras internas del ala de color uniforme y sin barras subterminales negras y sepia.

**MUDA**

Muda **postnupcial** completa, cambiando en las áreas de cría la mayor parte de las plumas corporales y las primarias externas (desde 3 hasta 7), después suspende la muda para la migración otoñal y la termina en las zonas de invernada. La muda **postjuvenil** es completa generalmente empezando en las zonas de cría con unas pocas plumas corporales y algunas primarias externas, después suspende la muda para la migración otoñal y la termina en las zonas de invernada. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** parcial cambiando la mayor parte de las plumas corporales y algunas primarias internas (**CUIDADO**: unas pocas aves jóvenes adquieren su primer **plumaje nupcial** en su **3º año** de vida).

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

**ESTATUS EN ARAGÓN**

Especie en paso. Puede encontrarse en los grandes ríos, lagunas y embalses de la Comunidad.