

**257 Ganga común**
**iberCaja**  
 Obra Social
**GANGA COMÚN** (*Pterocles alchata*)**IDENTIFICACIÓN**

30-32 cm. En plumaje **nupcial, macho** con dorso moteado de amarillo; obispillo barreado de negro y amarillo; cabeza amarillenta, garganta negra; banda pectoral castaña orlada de negro. **Hembra** amarillenta por encima, lista transversalmente de negro, ocre y gris; garganta clara. Ambos sexos tienen el abdomen blanco.

**ESPECIES SIMILARES**

De aspecto parecido a la **ortega**, que tiene las partes inferiores negras.

**SEXO**

En **plumaje nupcial, macho** con pecho, mejillas y ceja de color ocre intenso; mentón negro; dorso gris verdoso con manchas amarillas; una banda oscura en el pecho; secundarias más internas sin barreado; grandes coberteras de fondo marrón y gris, con líneas amarillas y negras. **Hembra** con pecho, mejillas y ceja de color ocre claro; mentón blanco; dorso barreado de amarillo, gris y negro; dos bandas oscuras en el pecho; secundarias más internas con barreado; grandes coberteras de fondo amarillo y gris, con líneas oscuras. En **plumaje no nupcial, macho** parecido a la **hembra**, pero distinguible con facilidad por las diferencias en el diseño de las coberteras del ala. **Juveniles** de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación hasta que comienzan a mudar las coberteras del ala en otoño.

**EDAD**

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juveniles** con una estría clara detrás del ojo; plumas del dorso y coberteras del ala de color ante, con borde crema y marcadas con una línea marrón en forma de "V"; plumas centrales de la cola cortas; coberteras primarias con punta clara; primarias marrón gris, con moteado claro; 10ª primaria oscura, puntiaguda; secundarias con margen ante; las más grandes infracoberteras del ala de color marrón.

**1º año otoño/2º año primavera** de aspecto similar al **adulto**, pero conservando las tres primarias más externas y sus coberteras primarias de tipo **juvenil**, más decoloradas y puntiagudas que el resto y conservando las coberteras su punta clara.

**Adultos** sin una estría clara detrás del ojo; plumas del dorso y coberteras sin línea marrón en forma de "V"; plumas centrales de la cola muy largas; coberteras primarias sin punta clara; primarias grises, con la barba interna marrón y borde claro; 10ª primaria con la barba interna marrón-gris y la externa gris, con la punta similar al resto; secundarias con margen claro; las más grandes infracoberteras del ala de color blanco o gris.

**MUDA**

Muda **postnupcial** completa, comenzando en mayo y que suele estar terminada en octubre, adquiriendo el plumaje de eclipse. Muda **postjuvenil** bastante completa, incluyendo todas las plumas excepto algunas primarias más externas y sus coberteras primarias. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial**, entre noviembre y marzo, que incluye plumas corporales para adquirir el plumaje nupcial.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

**ESTATUS EN ARAGÓN**

Especie sedentaria circunscrita a las zonas áridas de la Depresión Media del Ebro.