

**PITO REAL** (*Picus viridis*)

**IDENTIFICACIÓN**

30-32 cm. Dorso de color verde, con reflejos amarillos; partes inferiores gris verdoso; capirote rojo; **macho** con bigotera roja, **hembra** con bigotera oscura. **Juveniles** de tonos similares a los **adultos** pero con manchas blancas en el dorso y oscuras en las partes inferiores.

**ESPECIES SIMILARES**

No es posible la confusión con ninguna otra especie.

**SEXO**

**Adultos** y **juveniles** pueden sexarse por la coloración de la bigotera: **macho** con bigotera roja bordeada de negro; **hembra** con bigotera oscura. **CUIDADO:** algunos **machos** muy jóvenes pueden tener la bigotera oscura, por lo que este carácter en juveniles es completamente fiable sólo cuando la muda de las plumas del cuerpo está avanzada.

**EDAD**

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juveniles** con dorso moteado de blanco y partes inferiores moteadas de oscuro; terciarias con barreado prominente en la barba interna extendiéndose hasta la punta; coberteras primarias puntiagudas, de color gris marrón, a veces de color gris apagado en el borde; ojo gris marrón.

**1º año otoño/2º año primavera** de aspecto similar al **adulto**, pero con contraste entre las plumas del ala mudadas y retenidas; conserva todas (a veces mudan algunas) las terciarias y coberteras primarias de tipo **juvenil**.

**Adultos** con todas las plumas de la misma generación; dorso y partes inferiores sin moteado; el barreado de las terciarias no llega hasta la punta; coberteras primarias redondeas y de aspecto similar al del resto de las coberteras; ojo blanco con tinte rosáceo.

**MUDA**

Muda **postnupcial** completa, comienza en el mes de junio y suele estar terminada a primeros de noviembre. Muda **postjuvenil** parcial incluyendo las plumas del cuerpo, primarias, pequeñas y medianas coberteras y la cola; dejando las grandes coberteras, coberteras primarias (a veces cambian las más externas) y secundarias sin mudar; completada a primeros de noviembre.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

**ESTATUS EN ARAGÓN**

Especie sedentaria presente en toda la Comunidad a excepción de las áreas muy deforestadas.