

**157 Grulla común**
**iberCaja**  
 Obra Social
**GRULLA COMÚN** (*Grus grus*)**IDENTIFICACIÓN**

108-140 cm. **Adulto** de color gris pizarra; garganta, nuca y lados de la cara negros; lados de la cabeza y cuello blancos; píleo rojo; primarias negras; secundarias largas dando aspecto de formar parte de la cola; patas largas. **Juvenil** con plumaje castaño; cabeza de color castaño; secundarias más cortas.

**ESPECIES SIMILARES**

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

**EDAD**

Desde que la especie no se reproduce en Aragón, sólo pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**1º año otoño/2º año primavera** con la piel desnuda del capirote negra con tinte rojizo; cabeza y parte superior del cuello leonados; con una zona clara detrás del ojo; plumas corporales gris ceniza, habitualmente con las de las partes superiores con borde marrón.

**2º año otoño/3º año primavera** similares al **adulto**, pero con capirote no tan pelado; con algunas plumas viejas y marrones en escapulares, coberteras del ala, terciarias y partes inferiores; generalmente mantienen las primarias y secundarias **juveniles**, que son más estrechas y puntiagudas que las de los **adultos**.

**Adultos** con la piel desnuda del capirote roja; cabeza y cuello gris oscuro o negro, con una banda blanca detrás del ojo a cada lado de la cabeza; plumas corporales gris claro sin plumas marrones; primarias y secundarias más anchas y redondeadas que las de los **juveniles**.

**SEXO**

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje. El tamaño y el color de la base del pico pueden ser caracteres útiles en aves extremas: **macho** con ala mayor de 585 mm, base del pico de color rojo brillante; **hembra** con ala menor de 560 mm, base del pico de color rojo más apagado.

**MUDA**

Muda **postnupcial** completa pero no todos los años ya que las plumas de vuelo son cambiadas todas a la vez cada dos años o incluso cada cuatro años en algunos casos.. Muda **postjuvenil** parcial incluyendo sólo una cantidad variable de plumas corporales; habitualmente terminada en octubre.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

**ESTATUS EN ARAGÓN**

En paso e invernante, con presencia mayoritaria de la especie en la laguna de Gallo-canta y en algunos lugares de la Depresión del Ebro.