

290 Pito negro
iberCaja
 Obra Social
PITO NEGRO (*Drycopus martius*)**IDENTIFICACIÓN**

45-48 cm. Ave de color negro con rojo en el capirote; pico de color blanco.

ESPECIES SIMILARES

No es posible la confusión con ninguna otra especie.

SEXO

Juveniles y **adultos** pueden sexarse por la extensión de la mancha roja del píleo: **macho** con todo el capirote de color rojo; **hembra** con rojo sólo en la parte posterior del capirote.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles similares a los **adultos**, pero con el negro del plumaje más apagado y el rojo de la cabeza menos brillante; 10ª primaria de punta ancha, con borde de la barba interna convexo o recto, con la punta extendiéndose entre 16 a 28 mm más allá de las coberteras primarias; ojo gris azulado.

1º año otoño/2º año primavera con contraste entre las plumas del ala mudadas y retenidas.

Adultos con todas las plumas de la misma generación; 10ª primaria de punta estrecha, con borde de la barba interna cóncavo, con la punta extendiéndose entre 3 a 17 mm más allá de las coberteras primarias; ojo blanco amarillento.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, comienza sobre el mes de junio y suele estar terminada a finales de octubre. Muda **postjuvenil** parcial incluyendo las plumas del cuerpo, primarias, pequeñas y medianas coberteras y la cola; dejando las grandes coberteras, coberteras primarias internas (a veces cambian las más externas) y secundarias sin mudar; completada a primeros de noviembre.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie sedentaria presente a lo largo de todo el Pirineo ligada a bosques maduros.

290 Pito negro

