

325 Acentor alpino



ESPECIES SIMILARES

La única especie que tiene dorso rayado y cabeza gris es el **acentor común**, que carece de “babero” rayado y flancos castaños.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada a primeros de octubre. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo las plumas del cuerpo, pequeñas y medianas coberteras del ala y grandes coberteras más internas, así como frecuentemente terciarias; la mayor parte de las aves la terminan entre agosto y septiembre.

ACENTOR ALPINO (*Prunella collaris*)

IDENTIFICACIÓN

16-18 cm. Dorso gris, con marcas pardas; partes inferiores grisáceas, con flancos castaños; garganta blanca moteada de pardo; alas con coberteras oscuras y punta blanca; cola parda con punta blanca.

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación. El tamaño puede ser un carácter útil en casos extremos: **macho** con ala mayor de 109 mm; **hembra** con ala menor de 96 mm.


EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles muy parecidos a los **adultos**, pero con cabeza menos estriada; partes inferiores ante, con estrías mal definidas; flancos ante con estrías oscuras; plumaje nuevo.

1º año otoño/2º año primavera se reconocen por el diseño de las grandes coberteras no mudadas, que tienen un borde pardo entre la punta blanca y la base negruzca; a veces las grandes coberteras más internas con un punto blanco en su mitad interna; coberteras primarias y álula pardo oscuro, con borde claro sucio; plumas de vuelo y cola desgastadas; iris pardo-grisáceo.

Adultos con todas las plumas del ala de la misma generación; grandes coberteras con punta blanco puro, claramente delimitado del resto negro de la pluma; si las grandes coberteras más internas tienen un punto blanco está en su mitad externa; coberteras primarias y álula oscuras, con claro reborde blanco; plumas de vuelo y cola nuevas; iris pardo-rojizo.



Acentor alpino. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie sedentaria, propia del medio alpino, ampliamente distribuida por el Pirineo y más escasa en el Moncayo.