

345 Zorzal real



Zorzal real. Adulto. Hembra (05-XII).


ZORZAL REAL (*Turdus pilaris*)

IDENTIFICACIÓN

25-26 cm. Cabeza y parte posterior del cuello grises; espalda de color castaño; parte posterior del dorso gris; cola oscura; abdomen blanco; flanco claro, manchado de negro; infracoberteras del ala blancas; pico amarillo con punta ocre.

ESPECIES SIMILARES

El **zorzal común** tiene las infracoberteras alares anaranjadas; el **zorzal alirrojo** tiene las infracoberteras alares rojizas; el **zorzal charlo** tiene las infracoberteras del ala blancas, pero no tiene cejas claras y el dorso es pardo.



Zorzal común



Zorzal alirrojo



Zorzal charlo

SEXO

Macho con plumas de la cola oscuras o negras; plumas del dorso pardo-rojizo, con centro negruzco; algunos tienen una amplia mancha oscura en las plumas del píleo. **Hembra** con plumas de la cola pardo oscuro, pero no negras; plumas del dorso pardo, con centro oscuro, pero no negruzco; algunas tienen una estrecha mancha oscura en las plumas del píleo. **CUIDADO:** existen ejemplares de ambos sexos con mancha oscura de las plumas del píleo de diseño muy parecido.

EDAD

No se encuentran **juveniles** en Aragón, por lo que pueden reconocerse sólo 2 tipos de edad:


1º año otoño/2º año primavera con distinta coloración y diferencias de tamaño entre las grandes coberteras mudadas y no mudadas con punta clara; plumas de la cola puntiagudas.

CUIDADO: la mancha blanca del ápice de las grandes coberteras juveniles es muy variable.

Adultos con las plumas del ala de la misma generación; plumas de la cola redondeadas en la punta.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que termina entre agosto y septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial e incluye las plumas corporales, las pequeñas y medianas coberteras del ala y un número variable de grandes coberteras; a veces algunos ejemplares extienden su muda a las terciarias y alguna pluma de la cola; suele estar terminada entre julio y octubre.



Zorzal real. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares


FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie invernante ampliamente distribuida por toda la comunidad, preferente en zonas con arbolado abierto y disperso.

345 Zorzal real



Zorzal real. Infracorberteras del ala y diseño del flanco.




Zorzal real. Adulto. Hembra: diseño del pecho (05-XII).



Zorzal real. Adulto. Hembra: diseño de la cabeza (05-XII).



Zorzal real. Adulto. Hembra: diseño del dorso (05-XII).



Zorzal real. Adulto. Hembra: diseño del capirote (05-XII).



Zorzal real. Adulto. Hembra: diseño de las plumas del píleo (05-XII).



Zorzal real. Adulto. Hembra: diseño de la cola (05-XII).

345 Zorzal real



Zorzal real. Adulto. Muda postnupcial: ala de hembra (05-XII).