

34 Avetoro común



AVETORO COMÚN (*Botaurus stellaris*)

IDENTIFICACIÓN

70-80 cm. Partes superiores pardas, con tinte dorado y fuertemente rayadas; partes inferiores pardo amarillentas; capirote y bigoteras negras; pico amarillo verdoso.

ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación. El tamaño puede ser un carácter útil: **macho** con ala mayor de 335 mm; **hembra** con ala menor de 327 mm.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con diseño que recuerda al **adulto** pero el negro del capirote teñido de marrón y más pequeño, generalmente sin alcanzar la nuca; bigotera marrón; plumas del manto y escapulares muy moteadas y vermiculadas; primarias externas estrechas y puntiagudas.

1º año otoño/2º año primavera similar al **adulto**; si han mudado plumas en las coberturas del ala, plumas de vuelo, cola o escapulares entonces con dos generaciones de plumas; si las plumas del ala y cola tienen sólo una generación entonces con diseño **juvenil**.

Adulto con capirote negro no teñido de marrón y alcanzando la nuca; bigotera negra; plumas del manto y escapulares poco moteadas y vermiculadas; primarias externas anchas y con punta redondeada; con sólo una generación de plumas.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele durar todo el otoño (hasta enero). Muda **postjuvenil** parcial, cambiando las plumas corporales; algunos ejemplares pueden cambiar también coberturas del ala, cola, escapulares o plumas de vuelo; generalmente terminada en noviembre.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Sedentario, muy localizado en carrizales de Gallocanta, Cinco Villas, Sariñena y Bajo Cinca.