

353 Buscarla unicolor



Buscarla unicolor. Otoño. Adulto con muda completa (05-IX)


BUSCARLA UNICOLOR (*Locustella luscinioides*)

IDENTIFICACIÓN

13-14 cm. Plumaje pardo, con partes inferiores más claras; cola ancha; pico pardo y patas pardo-oliva; sin cerdas en la comisura de la boca.

ESPECIES SIMILARES

Parecida al **carricero común**, que tiene cerdas en la comisura de la boca y cola con plumas de similar longitud; el **ruiseñor bastardo** tiene 10 plumas en la cola.



R u i s e ñ o r bastardo.

Carricero común.



SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse hasta 3 tipos de edad:

1º año generalmente con las plumas del ala de la misma generación y nuevas (**CAUTION:** raramente algún ejemplar puede tener límites de muda en las plumas de vuelo); habitualmente con puntos negros en la lengua (**CAUTION:** algunos ejemplares carecen de ellos); iris pardo gris.

2º año en el caso de los ejemplares que no han mudado las plumas de vuelo, que estarán muy desgastadas; si han mudado parte tienen dos generaciones de plumas; algunos ejemplares conservan todavía puntos negros en la lengua. (**CAUTION:** si han hecho muda completa son indistinguibles de los adultos por el plumaje).

Adultos con las plumas de la misma generación pero desgastadas o con dos generaciones de plumas (**CAUTION:** los ejemplares que tienen muda completa en su área de cría tienen las plumas del ala de la misma generación y nuevas); sin puntos negros en la lengua; iris pardo rojizo.

MUDA


Muda **postnupcial** completa, que puede completarse en las zonas de cría, comenzar en Europa y detenerse para terminar en África o comenzar en las zonas de invernada. La muda **postjuvenil** es muy variable pudiendo ser completa, dejar sin cambiar algunas primarias externas o incluso todas la plumas de vuelo.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie en paso, asociada a vegetación de zonas húmedas como carrizales y tamarizales. Posible nidificación en la Laguna de Gallocanta.



Buscarla unicolor. Diseño de la cola y ausencia de cerdas en la boca.


353 Buscarla unicolor



Buscarla unicolor. Otoño. Adulto con muda suspendida (18-IX)



Buscarla unicolor. Otoño. 1º año con muda suspendida (24-VIII).



Buscarla unicolor. Otoño. Adulto con muda no comenzada ()




Buscarla unicolor. Otoño. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto (05-IX); centro adulto (18-IX); abajo 1º año (06-IX).



Buscarla unicolor. Otoño. 1º año no mudado (06-IX).

353 Buscarla unicolor



Buscarla unicolor. Otoño. Adulto. Diseño del pecho: arriba izquierda con muda completa (05-IX); arriba derecha con muda suspendida (06-IX); izquierda con muda no comenzada ().



Buscarla unicolor. Otoño. Adulto. Diseño del dorso: arriba izquierda con muda completa (05-IX); arriba derecha con muda suspendida (06-IX); izquierda con muda no comenzada ().


Buscarla unicolor. Otoño. 1º año. Diseño del pecho: izquierda no mudado (06-IX); derecha con muda suspendida (24-VIII).



Buscarla unicolor. Otoño. 1º año. Diseño del dorso: izquierda no mudado (06-IX); derecha con muda suspendida (24-VIII).

Buscarla unicolor. Otoño. 1º año. Diseño de la cola: izquierda no mudado (06-IX); derecha con muda suspendida (24-VIII).

353 Buscarla unicolor



Buscarla unicolor. Otoño. Adulto. Diseño de la cola: arriba izquierda con muda completa (08-X); arriba derecha con muda suspendida (06-IX); izquierda con muda no comenzada ().

Buscarla unicolor. Otoño. Adulto con muda no comenzada: diseño del ala ()




Buscarla unicolor. Otoño. 1º año no mudado: diseño del ala (06-IX).



Buscarla unicolor. Otoño. Adulto con muda completa: diseño del ala (05-IX)



Buscarla unicolor. Otoño. 1º año con muda suspendida: diseño del ala (24-VIII).



Buscarla unicolor. Otoño. Adulto con muda suspendida: diseño del ala (18-IX)