

379 Mosquitero silbador



MOSQUITERO SILBADOR (*Phylloscopus sibilatrix*)

IDENTIFICACIÓN

12-13 cm. Partes superiores verdosas, con tinte amarillento; ceja y mejillas amarillas; garganta y pecho amarillos; vientre blanco; patas pardo-amarillo claro.

ESPECIES SIMILARES

El contraste entre la ceja, garganta y pecho amarillos con el vientre blanco, hacen a esta especie diferente del resto de los mosquiteros.



Mosquitero común



Mosquitero musical



Mosquitero ibérico



Mosquitero papialbo

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación.

EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juveniles con el plumaje nuevo; plumas del ala y cola con bordes verde-amarillento.

Adultos con las plumas de la cola y el ala desgastadas; si han mudado grandes coberteras y terciarias, entonces con contraste entre las plumas nuevas y viejas.

En primavera, después de la muda **prenupcial** no es posible datar la edad utilizando el plumaje.

MUDA

Muda **postnupcial** parcial en las zonas de cría que incluye plumas del cuerpo y, a veces, terciarias y algunas grandes coberteras. La muda **postjuvenil** abarca sólo plumas corporales. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** completa en las áreas de invernada africanas, siendo después indistinguibles por el plumaje.

FENOLOGÍA

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

ESTATUS EN ARAGÓN

Estival, con citas de nidificación muy localizadas en hayedos del Pirineo occidental. Raro en época de paso en cualquier lugar de la Comunidad.