

37 Martinete común**MUDA**

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en noviembre. Muda **postjuvenil** parcial, reducida a las plumas corporales, en sus áreas de invernada.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival, muy localizada como reproductora en puntos concretos del río Ebro y sus afluentes.

Martinete común

MARTINETE COMÚN (*Nycticorax nycticorax*)

IDENTIFICACIÓN

58-65 cm. **Adulto** con dorso, píleo y nuca negros; alas, obispillo y cola azulados; resto del plumaje blanco. Los **juveniles** son pardos con estrías blancas en el dorso; rayado de oscuro en partes inferiores.

ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación.

EDAD

Pueden reconocerse hasta 4 tipos de edad:

Juveniles con plumaje pardo oscuro por encima, con estrías claras; pardo claro por abajo, con rayado pardo más oscuro; pico amarillento; ojos amarillos.

2º año con diseño que recuerda al **adulto**, pero partes negras sin brillo; lados del cuello rayados de pardo; plumas de vuelo juveniles; pico con tinte amarillento; ojos marrón-rojizos.

3º año primavera en algunos ejemplares con aspecto de **adulto**, pero con plumaje extremadamente desgastado.

Adulto con partes superiores negro brillante; sin rayado en los lados del cuello; plumaje nuevo en primavera; pico negro; ojos rojizos.