

# 398 Agateador común



Agateador común. Adulto (26-IX).

**AGATEADOR COMÚN** (*Certhia brachydactyla*)

## IDENTIFICACIÓN

11-13 cm. Partes superiores pardas estriadas de blanco; obispillo ocre; cabeza con ceja blanca y pico largo y ligeramente recurvado; garganta blanca y partes inferiores blanco-grisáceas, con flancos parduscos; pluma más grande del álula generalmente con una línea blanca en su parte exterior; manchas ocre del ala con punta en sierra; puntas claras de las primarias internas con forma de rombo; cola característica de color pardo; uña posterior 6,8-8,9 mm.

## ESPECIES SIMILARES

El **agateador norteño** es muy similar y difícil de separar en ocasiones: la uña posterior es más larga (7,6-11,5 mm); la pluma más grande del álula no suele tener una línea blanca continua en su margen; las manchas ocre del ala suelen tener punta cuadrada y las puntas claras de las primarias internas es amplia.

## SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación.

## EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:


**Juveniles** con aspecto parecido al de los **adultos**, si acaso con dorso más punteado; pecho blanquecino con algunas plumas marronáceas; plumaje nuevo.

**Adultos** con dorso con aspecto estriado; pecho de tonalidad ante-marrón.

**CUIDADO:** después de la muda **postnupcial/postjuvenil** es muy difícil datar la edad utilizando el plumaje. Se ha citado para diferenciar la edad la forma de la punta y de la mancha clara de la cobertera primaria más larga, que es pequeña y con punta redondeada en el **adulto** y con forma de gota y puntiaguda en el **juvenil**, si bien parece ser que este carácter no siempre se cumple.

## MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada hacia la mitad de septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo las plumas del cuerpo, pequeñas y medianas coberteras del ala y frecuentemente las terciarias y todas las grandes coberteras; suele estar completada hacia mediados de octubre.



Agateador común. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares  
■ Algunos ejemplares

## FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

## ESTATUS EN ARAGÓN

Es una especie sedentaria ampliamente distribuida por todas las zonas forestales de la Comunidad.



Agateador común. Juvenil (19-VII).

# 398 Agateador común



Agateador común. Izquierda diseños del álula; abajo diseño de las manchas ocreas del ala, de la cola y puntas de las primarias internas.



Agateador común. Diseño del pecho: arriba adulto (26-IX); abajo juvenil (19-VII).



Agateador común. Diseño del dorso: izquierda adulto (26-IX); derecha juvenil (19-VII).




Agateador común. Diseño de la cabeza: arriba adulto (26-IX); abajo juvenil (19-VII).



Agateador común. Diseño de la mancha y de la punta de la cobertera primaria más larga: izquierda adulto (22-VIII); derecha juvenil (26-VI).

## 398 Agateador común



Agateador común. Adulto: diseño del ala (22-VIII).



Agateador común. Juvenil: diseño del ala (19-VII).