


# 401 Alcaudón dorsirrojo



Alcaudón dorsirrojo. Adulto. Macho ().

## ALCAUDÓN DORSIRROJO (*Lanius collurio*)

### IDENTIFICACIÓN

17-18 cm. **Adultos** con dorso pardo; **macho** con cabeza gris y antifaz negro; partes inferiores claras; **hembra** sin negro en la cara; cabeza ocre. **Juveniles** de tono pardo, barreados, con tonos rojizos.

### ESPECIES SIMILARES

Recuerda a un **alcaudón común**, que tiene dorso gris y cabeza de color castaño. Los **juveniles** de ambas especies son parecidos siendo los del **alcaudón común** más grises en el dorso, con blanco en las escapulares y con la mancha de la pluma más externa de la cola quedando alejada del ápice



Alcaudón común. Arriba juvenil; derecha macho.



### SEXO

El **macho** tiene las partes inferiores blanco rosáceo, sin barras; cabeza gris ceniza, con antifaz negro; cola negra y blanca. La **hembra** muestra las partes inferiores blanco-ante, con flancos barreados; cabeza de color pardo, con auriculares pardo-rojizo; plumas de la cola pardo oscuras; la pluma más exterior más clara y con punta blanca. Los **juveniles** no se pueden sexar. **CUIDADO:** algunas **hembras** muestran un aspecto similar al de los **machos**, si bien siempre tienen las partes inferiores barreadas.

### EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

**Juveniles** con diseño parecido al de las **hembras**, pero dorso con plumas con una marca clara en forma de media luna; coberteras del ala con una línea oscura en el ápice; plumaje nuevo.

**Adultos** con plumaje desgastado en verano; dorso sin marca clara; coberteras del ala sin una línea oscura en el ápice.

Después de la muda **prenupcial** no es posible datar la edad utilizando el plumaje.

### MUDA



Muda **postnupcial** y **postjuvenil** parciales, abarcando, antes de la migración, plumas corporales y, en algunos ejemplares, terciarias, par central de plumas de la cola o coberteras del ala. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** completa en las áreas de invernada.

### FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII


### ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival propia de valles húmedos con prados de siega, muy extendida en los Pirineos y localizada en el Sistema Ibérico donde se encuentra en expansión.



Alcaudón dorsirrojo. Juvenil. Diseño de escapulares y cola.

# 401 Alcaudón dorsirrojo




Alcaudón dorsirrojo. Adulto. Hembra ().




Alcaudón dorsirrojo. Diseño de la cabeza: arriba izquierda macho (), arriba derecha hembra (); izquierda juvenil (12-IX).




Alcaudón dorsirrojo. Juvenil (12-IX).




Alcaudón dorsirrojo. Diseño del pecho: arriba izquierda macho (), arriba derecha hembra (); izquierda juvenil (12-IX).



Alcaudón dorsirrojo. Diseño del pecho: arriba macho (), centro hembra (); abajo juvenil (12-IX).




Alcaudón dorsirrojo. Diseño del capirote: arriba izquierda macho (), arriba derecha hembra (); izquierda juvenil (12-IX).




# 401 Alcaudón dorsirrojo



Alcaudón dorsirrojo. Diseño del dorso: arriba izquierda macho (), arriba derecha hembra (); izquierda juvenil (12-IX).




Alcaudón dorsirrojo. Diseño de la cola: arriba izquierda macho (), arriba derecha hembra (); izquierda juvenil (12-IX).



Alcaudón dorsirrojo. Adulto. Macho: diseño del ala ().



Alcaudón dorsirrojo. Diseño de escapulares: izquierda macho (), centro hembra (); derecha juvenil (12-IX).



Alcaudón dorsirrojo. Adulto. Hembra: diseño del ala ().

## 401 Alcaudón dorsirrojo



Alcaudón dorsirrojo. Juvenil: diseño del ala (12-IX).