

410 Chova piquigualda



CHOVA PIQUIGUALDA (*Pyrrhocorax graculus*)

IDENTIFICACIÓN

37-38 cm. Plumaje negro brillante uniforme; pico curvado; pico amarillo y patas de color rojo.

ESPECIES SIMILARES

Entre las aves de color negro es la única que tiene el pico de color amarillo. La **chova piquirroja** es parecida pero tiene el pico más largo y de color rojo.



Chova piquirroja

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:


Juveniles con plumaje nuevo; patas oscuras con marcas anaranjadas; pico anaranjado.

1º año otoño/2º año primavera con contraste entre las plumas corporales (y pequeñas coberteras si están cambiadas) brillantes y las juveniles de alas y cola sin brillo; plumas de vuelo y cola desgastadas; plumas de la cola puntiagudas.

Adultos con el plumaje negro brillante uniforme y poco desgastado; plumas de la cola redondeadas.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada a finales de octubre. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo las plumas corporales y pequeñas y medianas coberteras del ala; terminada a primeros de octubre.



Chova piquirroja. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año. Nidifica en las zonas más altas del Pirineo, bajando a altitudes menores en invierno.

SEXO

No hay diferencias en cuanto al plumaje, aunque el tamaño puede ayudar a sexar a los ejemplares extremos: **macho** con ala mayor de 270 mm; **hembra** con ala menor de 269 mm.