

421 Gorrión molinero

Gorrión molinero. Invierno (25-X).

GORRIÓN MOLINERO (*Passer montanus*)

IDENTIFICACIÓN

12-14 cm. Capirote rojizo, mejillas blancas con una mancha negra, collar blanco y babero negro pequeño.

ESPECIES SIMILARES

Podría haber confusión con los machos de **gorrión común**, que tiene el capirote gris y babero negro que le baja por el pecho.



Gorrión común. Macho en invierno.

EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juveniles con aspecto parecido al de los adultos, pero con colores más apagados y plumaje nuevo.

Adultos con plumaje desgastado y colores más contrastados.

Después de la muda **postnupcial/postjuvenil** no es posible datar la edad utilizando el plumaje.

SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

MUDA

Muda **postnupcial** y **postjuvenil** completa, que suele estar terminada en octubre-noviembre.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Sedentario. Ampliamente repartido por toda la Comunidad faltando en las áreas más montañosas y deforestadas de la Depresión del Ebro.



Gorrión molinero. Primavera. Adulto (06-V).



Gorrión molinero. Verano. Adulto (03-VII).

421 Gorrión molinero



Gorrión molinero. Verano. Juvenil (18-VI).



Gorrión molinero. Diseño de la cabeza. De arriba hacia abajo: en invierno (25-X); en primavera (06-V); adulto en verano (03-VII); juvenil (18-VI).



Gorrión molinero. Diseño del pecho: izquierda en invierno (25-X); derecha en primavera (06-V).



Gorrión molinero. Verano. Diseño del pecho: izquierda adulto (03-VII); derecha juvenil (18-VI).




Gorrión molinero. Diseño del dorso: izquierda en invierno (25-X); derecha en primavera (06-V).

421 Gorrión molinero



Gorrión molinero. Verano. Diseño del dorso: izquierda adulto (03-VII); derecha juvenil (18-VI).




Gorrión molinero. Invierno: diseño del ala (25-X).



Gorrión molinero. Primavera: diseño del ala (06-V).



Gorrión molinero. Diseño y desgaste de la cola: izquierda en invierno (25-X); derecha en primavera (06-V).



Gorrión molinero. Verano. Adulto: diseño del ala (03-VII).



Gorrión molinero. Verano. Diseño y desgaste de la cola: izquierda adulto (03-VII); derecha juvenil (18-VI).



Gorrión molinero. Verano. Juvenil: diseño del ala (29-VII).