

423 Gorrión alpino
iberCaja
 Obra Social
EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juveniles con aspecto parecido al de las **hembras**, pero con cabeza más parda, blanco de la cola ocre; plumaje nuevo.

Adultos con plumaje desgastado en verano.

Después de la muda **posnupcial/postjuvenil** no es posible datar la edad utilizando el plumaje.

MUDA

Muda **postnupcial** y **postjuvenil** completas, que suele estar terminada a primeros de noviembre.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

GORRIÓN ALPINO (*Montifringilla nivalis*)

IDENTIFICACIÓN

16-18 cm. Dorso pardo oscuro; obispillo y coberteras de la cola oscuras; partes inferiores blancas; alas con primarias de color negro y secundarias de color blanco; cola negra en el centro, blanca en los lados; cabeza gris; pico negro en primavera, amarillo en invierno.

ESPECIES SIMILARES

No es posible confundir esta especie con ninguna otra

SEXO

El **macho** con píleo y nuca gris azulado; cuello gris ceniza; centro de la garganta negro, sólo parcialmente oculto en plumaje nuevo de otoño; obispillo, coberteras supracaudales y primarias externas negras; pequeñas coberteras del ala blancas o con puntas negras; coberteras primarias blancas con un poco de negro en la punta; pico negro en época nupcial; ala mayor de 121 mm. La **hembra** con píleo y nuca gris pardo; cuello gris ante; centro de la garganta parcialmente negro, completamente oculto en plumaje nuevo de otoño; obispillo, coberteras supracaudales y primarias externas pardo-negras; pequeñas coberteras del ala con puntas pardas; coberteras primarias con blanco sólo en la parte interna, la parte externa es gris-pardo oscuro; pico amarillo con la punta negra en época nupcial; ala menor de 116 mm. Los **juveniles** no se pueden sexar.

ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año en la alta montaña pirenaica; en invierno ocupa cotas más bajas.