

45 Cigüeña negra



MUDA

Muda **postnupcial** completa que comienza en periodo de cría y termina durante el invierno. Muda **postjuvenil** completa, comenzando con las plumas corporales en febrero de su 2º año; las plumas del ala comienzan a mudarse en mayo y terminan en invierno.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

En paso, con citas repartidas por toda la Comunidad.

CIGÜEÑA NEGRA (*Ciconia nigra*)

IDENTIFICACIÓN

95-100 cm. Plumaje negro; infracoberteras de la cola, axilares y partes inferiores blancas; pico y patas rojos.

ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse hasta 3 tipos de edad:

Juveniles con diseño similar al **adulto**, pero con plumas de la cabeza, cuello y pecho gris marrón apagado con puntas claras; resto de partes superiores con tonos apagados; supracoberteras del ala con estrechos márgenes claros; pico verdoso.

2º año con límites de muda entre las plumas negro-morado del **adulto** y las más apagadas del **juvenil**.

Adultos con plumas de la cabeza, cuello y pecho con fuerte brillo morado y verde; supracoberteras del ala sin estrechos márgenes claros; pico rojo brillante.