

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en agosto. Muda **postjuvenil** parcial, cambiando las plumas del cuerpo, cola y algunas coberteras del ala; algunos ejemplares han terminado de mudar en noviembre, pero otros todavía en muda activa tan tarde como febrero.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Invernante, con presencia muy escasa en cualquier punto de agua grande de la Comunidad.

ÁNSAR COMÚN (*Anser anser*)**IDENTIFICACIÓN**

75-90 cm. Plumaje de color pardo; cabeza y cuello gris ceniza; vientre blanquecino; coberteras de la cola blancas; pico naranja o rosa; patas rosas.

ESPECIES SIMILARES

Muy parecido al **ánsar campestre** (*Anser fabalis*), con negro en el pico y patas anaranjadas, si bien es una especie con muy pocas citas en Aragón.

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar. El tamaño puede ser de ayuda sólo en ejemplares extremos: **macho** con ala mayor de 467 mm y peso mayor de 4 Kg. **Hembra** con ala menor de 445 mm y peso menor de 2,6 Kg.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

1º año otoño/2º año primavera con coberteras del ala **juveniles**, que son estrechas y de color gris claro con puntas ante; sin barreado en las partes inferiores; anillo ocular apagado.

2º año otoño/3º año primavera sólo en los ejemplares que han retenido medianas coberteras del ala **juveniles**.

Adulto con coberteras del ala anchas y redondeadas, de color gris azulado y puntas blancas; partes inferiores con barreado oscuro; anillo ocular rosa o amarillo.