

77 Cerceta común

Cerceta común. Macho adulto

CERCETA COMÚN (*Anas crecca*)**IDENTIFICACIÓN**

34-38 cm. **Macho** en invierno con cabeza de color castaño con antifaz verde; pecho claro moteado de oscuro; dorso y flancos vermiculados de gris; espejuelo verde y negro bordeado de blanco. **Hembra** de color pardo, con moteado y rayado blanco; espejuelo como el **macho**.

ESPECIES SIMILARES

Macho con plumaje inconfundible. El diseño del espejuelo del ala y su pequeño tamaño diferencia a la **hembra** del resto de los ánades pardos.

SEXO

Macho en plumaje **nupcial** inconfundible con cabeza de color castaño y antifaz verde; flanco vermiculado de gris; pico oscuro. **Hembra** de color pardo; pico gris. No es probable encontrar esta especie en plumaje **no nupcial** en Aragón.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, adquiriendo el plumaje de eclipse, que suele estar terminado a finales de septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial, cambiando las plumas del cuerpo y terciarias; terminada entre octubre y noviembre. Ambas clases de edad, a partir de septiembre, tienen una muda **prenupcial** parcial en la que adquieren el plumaje de cría.

EDAD

Dado que no es probable su reproducción en Aragón, pueden reconocerse únicamente 2 tipos de edad:

1ª año otoño/2º año primavera con las plumas de vuelo juveniles retenidas, que estarán desgastadas. **Machos** con terciarias ligeramente curvadas o rectas, con reborde pálido y generalmente desgastadas en la punta; grandes coberteras estrechas y con punta redondeada. **Hembras** con grandes coberteras estrechas, con bordes no paralelos y punta redondeada; coberteras terciarias estrechas y desgastadas, con estrecho reborde blanco.

Adultos con las plumas de vuelo poco desgastadas. **Machos** con terciarias largas, grises, recurvadas y terminadas en punta; grandes coberteras anchas y con punta cuadrada. **Hembras** con grandes coberteras anchas, con anchura homogénea y punta cuadrada; coberteras terciarias anchas y redondeadas, de borde liso y amplio ribete blanco o cremoso.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie invernante, con algunos ejemplares no reproductores que quedan en verano y una cita antigua de nidificación en Gallocanta. En invierno o en paso puede encontrarse en cualquier punto de aguas someras de la Comunidad.