

ÁNADE RABUDO (*Anas acuta*)

IDENTIFICACIÓN

51-66 cm. En plumaje **nupcial macho** con cabeza y garganta pardo oscuro; lados de la cabeza y cuello blancos; pecho blanco; plumas del dorso largas y con bordes crema; flancos grises y vermiculados; partes inferiores claras; infracoberteras de la cola negras; plumas de la cola muy largas; pico gris azulado. **Hembra** con plumaje pardo; partes inferiores claras; pico gris azulado.

SEXO

Macho con cabeza, garganta y parte posterior del cuello marrón oscuro; banda a los lados del cuello, pecho y partes inferiores centrales de color blanco; escapulares y terciarias largas y de color gris con una estría central negra; par central de las plumas de la cola muy largo y puntiagudo; infracoberteras de la cola negras; espejuelo azul y azul gris; infracoberteras del ala de color gris y blanco. **Hembra** con plumaje marrón claro, moteado o estriado de negro o marrón; terciarias sepia con tinte oliváceo; espejuelo gris con menos brillo verde que en el **macho**; infracoberteras de la cola blancas con estrías marrón oscuro; infracoberteras del ala barreadas, de color marrón claro con bordes más claros.

No es probable encontrar esta especie en Aragón en plumaje **no nupcial**.

EDAD

Desde que esta especie no cría en Aragón, sólo pueden reconocerse 2 tipos de edad:

1º año otoño/2º año primavera con una variable cantidad de plumas **juveniles** retenidas en el cuerpo, cola y alas; las grandes coberturas **juveniles** retenidas con punta estrecha; si se han retenido terciarias **juveniles**, entonces son estrechas y puntiagudas, de color marrón gris con una mancha oscura en el centro; algunas o todas las plumas de la cola pueden ser **juveniles** retenidas.

Adulto con grandes coberteras con punta ancha y cuadrada; terciarias en el **macho** de color gris perla con centros oscuros; en la **hembra** de color gris marrón con centros oscuros.

MUDA

Desde octubre, ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** parcial adquiriendo el plumaje nupcial; durante los primeros meses del **invierno** las terciarias, cola y algunas plumas corporales pueden estar en muda activa.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Invernante, con presencia en números bajos en cualquier laguna de la Comunidad.