

**CERCETA CARRETONA** (*Anas querquedula*)

**IDENTIFICACIÓN**

37-41 cm. En plumaje **nupcial macho** con amplia ceja blanca que alcanza la nuca; cabeza y pecho pardo oscuro moteado; flanco gris; abdomen blanco; escapulares largas, blancas y negras; espejuelo verde poco brillante, bordeado de blanco. **Hembra** de color pardo rayado; espejuelo pardo verdoso; coberteras del ala grises; pico gris.

**ESPECIES SIMILARES**

**Macho** con plumaje inconfundible. El diseño del espejuelo del ala, el tamaño y el pico gris diferencia a la **hembra** del resto de los ánades pardos.

**EDAD**

Pueden reconocerse 3 tipos de edad (ver **SEXO**):

**Juvenil** con una muesca en la punta de las plumas de la cola, por la que asoma el raquis desnudo; grandes coberteras estrechas y puntiagudas, generalmente con una mancha negra en la punta de la barba interna; espejuelo sólo verde metálico apagado en el **macho** y sin tinte verde en la **hembra**.

**2º año primavera** con las plumas de vuelo **juveniles** retenidas, que estarán muy desgastadas; algunos ejemplares conservan plumas corporales o coberteras del ala **juveniles** retenidas.

**Adulto** en **primavera** con plumas de vuelo y coberteras del ala nuevas. En **otoño** con grandes coberteras anchas y redondeadas sin una mancha negra en la punta de la barba interna; espejuelo verde brillante en el **macho** y gris apagado con un ligero tinte verde en las secundarias internas en la **hembra**.

**SEXO**

**Macho** en plumaje **nupcial** inconfundible con capirote marrón oscuro y mejillas doradas; amplia ceja blanca que alcanza la nuca; escapulares alargadas con mezcla de colores gris, verde oscuro, negro y blanco; pequeñas y medianas coberteras azul gris; espejuelo con brillo verde; secundarias y grandes coberteras con amplias puntas blancas. En plumaje de **eclipse** parecido a la **hembra**, pero con coberteras con tinte azulado y espejuelo verde.

**Hembra** con plumaje marrón; estrecha ceja clara; sin escapulares alargadas; pequeñas y medianas coberteras gris marrón; espejuelo gris marrón apagado, a veces con un ligero tinte verde en las secundarias más internas; grandes coberteras con puntas blancas estrechas; secundarias con puntas blancas sólo en las barbas externas.

Los **juveniles** se pueden sexar: **macho** con pequeñas y medianas coberteras con tinte azulado; grandes coberteras con anchas puntas blancas; espejuelo verde metálico apagado; secundarias con puntas blancas. **Hembra** con pequeñas y medianas coberteras sin tinte azulado; grandes coberteras y secundarias con puntas blanco o blanco sucio estrechas; espejuelo gris marrón apagado y sin tinte verdoso.

**MUDA**

Muda **postnupcial** completa, adquiriendo el plumaje de eclipse, que suele estar terminado en agosto. La muda **postjuvenil** es parcial, cambiando las plumas del cuerpo, cola, unas pocas terciarias y algunas coberteras del ala; comienza en septiembre y terminada en las zonas de invernada. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** parcial en la que adquieren el plumaje de cría.

**FENOLOGÍA**

|   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |

**ESTATUS EN ARAGÓN**

Presente exclusivamente durante los pasos migratorios en cualquier masa de agua de la Comunidad.