

# 84 Pato colorado



## PATO COLORADO (*Netta rufina*)

### IDENTIFICACIÓN

53-57 cm. **Macho** con cabeza castaño-rojiza; pecho y parte posterior del cuerpo negros; flancos blancos; alas castañas con una banda blanca; pico rojo. **Hembra** de color pardo claro; parte superior de la cabeza castaño, la inferior blanco; pico gris rosado.

### ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

### SEXO

**Macho** en plumaje **nupcial** inconfundible con cabeza y nuca castaño-rojiza; pecho y parte trasera negros; flanco de color blanco; parte superior del ala con una marcada línea blanca; pico y ojos rojizos; en plumaje **no nupcial** con diseño similar a la **hembra**, pero distinguible por el pico y ojos rojizos y mantener el blanco de la parte superior del ala. **Hembra** con cuerpo marrón; cabeza marrón por arriba y mejillas blancuzcas; parte superior del ala del mismo color que el resto del ala o con sólo trazas de blanco; ojos rojizo-marrón y pico gris marrón con punta rosácea. En aves **juveniles**, sexos similares si bien el **macho** tiene más blanco en la parte superior del ala.

### EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juveniles** con diseño parecido al de la **hembra** pero con plumas de la cola estrechas; grandes coberteras estrechas con puntas redondeadas; pico gris oscuro; iris marrón claro.

**1ª año otoño/2º año primavera** con plumas de vuelo **juveniles** retenidas. **Macho**, con partes inferiores más apagadas y moteadas y no negras como en el **macho adulto**; **hembra** con partes superiores y capirote más gris-marrón que en la **hembra adulta**.

**Adultos** con grandes coberteras anchas con puntas cuadradas. **Macho** con partes inferiores negras.

### MUDA

Muda **postnupcial** completa, adquiriendo el plumaje de eclipse, que suele estar terminada en septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial, cambiando las plumas del cuerpo, cola y terciarias; habitualmente terminada en octubre. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** parcial en la que adquieren el plumaje de cría.

### FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

### ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año. Muy escaso como nidificante, con una mayoría de parejas en la estanca de Chiprana.